



2025年植樹月 贈苗活動

林業及自然保育署臺中分署



土肉桂

[學名]

Cinnamomum osmophloeum

[樹種特性]

臺灣特有種，樹皮可以替代肉桂，根部及葉片肉桂醛含量高。枝葉提取的精油，具有芳香、殺菌與增甜等功效，可添加於防蚊驅蟲清潔用品、美容保養品與食品中。

[栽植要點]

耐陰性植物，為常綠喬木，亦為蝴蝶食草，適合種植於校園、住家或公園綠地。



有熊森林
FANCA Taichung
自然環境中心

山櫻花

[學名]

Prunus campanulate

[樹種特性]

花色緋紅，花期為1-3月，在所有觀賞櫻花中最早開花，又稱緋寒櫻，果實可誘鳥，亦可製酒，用途多元。

[栽植要點]

適合全日照濕潤環境，可作為庭園樹、行道樹、花材和盆栽觀賞。因不易萌櫟，不建議大幅修剪枝條。



霧社山櫻花

[學名]

Prunus taiwaniana

[樹種特性]

臺灣特有種，花瓣白色，花期3~4月，花果是鳥獸的食物，鐘形花冠筒中富含蜜汁，核果黑熟時亦具甜味，為森林鳥獸之重要食餌。

[栽植要點]

適合中海拔全日照濕潤環境，因不易萌蘖，不建議大幅修剪枝條。



金毛杜鵑

[學名]

Rhododendron oldhamii

[樹種特性]

臺灣特有種，花色磚紅、艷麗，花期甚長，從3月一直可開到10月間，是臺灣野生杜鵑中花期最長的一種。

[栽植要點]

陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



臺灣肖楠

[學名]

Calocedrus formosana

[樹種特性]

臺灣特有種，樹幹通直，樹冠呈圓錐狀，姿態如同聖誕樹般優美，枝葉細緻柔順。

[栽植要點]

成株高大必須預留生長空間，適時修剪枝條，可保持樹形優美。能適應平地氣候，環境陽光充裕或半陰均可，生長速度中等至緩慢，壽命長。



楓香

[學名]

Liquidambar formosana

[樹種特性]

葉子夏綠秋紅，形似三叉戟，果實如圓形小刺球，外型充滿趣味且木料用途廣泛，廣受大眾喜愛。

[栽植要點]

陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



月橘(七里香)

[學名]

Murraya paniculate

[樹種特性]

搓揉葉片會有類似柑橘的味道，
持葉透過光線看會有許多「油
點」，正是芸香科植物的明顯特
徵。

[栽植要點]

陽光充足處，適合砂質土，梅雨
季節及夏日要慎防積水。



華八仙

[學名]

Hydrangea chinensis

[樹種特性]

枝條柔軟易四散生長，春季在莖頂開花，多朵花聚集成球，外緣的不孕花像白蝴蝶，圍繞中間真正能受孕的淺黃色小花。

[栽植要點]

適合半日照且高濕度環境。不耐旱。春至秋季每季施用一次長效性肥料。如果枝條散亂，可以於冬季進行強剪。



[學名]
Camellia japonica

[樹種特性]
花期 1~4 月，臺灣原生茶屬植物
中花最大且最為紅艷的茶花，生
命力強健。

[栽植要點]
適合透氣濕潤、有機質豐富、排
水良好的微酸性土壤。適合半遮
陰的環境。幼苗生長期間，不適
合烈日暴晒，陽光直射易灼傷葉
片。

日本山茶(鳳凰山茶)



臺灣香檬

[學名]

Citrus depressa

[樹種特性]

葉、花、果皆有香味，香氣屬味道較清香者。果除了榨汁飲用外，也可以入菜，芳香的葉子可以泡茶、熬湯頭。枝細長，暗綠色，具銳刺，觸摸時須小心。

[栽植要點]

喜日照，栽植後約3年開始結果。



臺灣百合

[學名]

Lilium formosanum

[樹種特性]

臺灣特有種，多年生草本，花白色喇叭狀，基部及花被外中肋帶紫紋。花莖的角度變化特殊。在花苞初現時是0度、花苞成型時呈俯角180度、開花時再倒仰90度，結實時又回復0度；亦稱「垂直開花」。

[栽植要點]

種植時須注意勿傷鱗莖，平地4-5月開花，避免強光直射，冬天會休眠不需常澆水。。



油葉石櫟(小西氏石櫟)

[學名]

Lithocarpus konishii

[樹種特性]

臺灣特有種，常綠小喬木，殼斗淺碟形，堅果多扁球形，頂端有小尖突，種子形狀獨特，為野生動物喜愛的食物，亦受手工藝者歡迎。

[栽植要點]

喜歡全日照、溫暖環境，以排水良好的砂質壤土為佳，苗木宜2~3個月施肥一次，促進生長。大樹無須特別修剪，栽培時考慮光照，可展現優良樹形。



小葉赤楠

[學名]

Syzygium buxifolium

[樹種特性]

常綠小喬木或灌木，小枝平滑，略四稜。分布於臺灣全島低中海拔林緣灌叢中。小葉赤楠的木材質地細緻，堅硬通直且韌性極佳，可做為做長槍及弓箭材料，也可以用來製作一般器具的把柄。

[栽植要點]

喜歡全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



白水木

[學名]

Heliotropium foertherianum

[樹種特性]

多生長於沿海，為海岸防風造林樹種。葉輪生狀密集排列於枝條頂端，葉肉質性，兩面密佈銀白色絨毛，觸感極佳。花頂生呈蠍尾狀聚繖花序。

[栽植要點]

全日照環境，適應力強生長速度快，花期為每年3-5月，適合種植於海邊。



狗花椒

[學名]

Zanthoxylum avicennae

[樹種特性]

臺灣特有種，灌木至小喬木，枝幹具皮刺，生長於八卦山、大肚山與鐵砧山等集中於臺灣中部西緣，冬天乾旱礫石層的丘陵地，族群數量稀少，早期作為藥用或花椒替代品。屬植物紅皮書中易危樹種。

[栽植要點]

陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



青楓

[學名]

Acer serrulatum

[樹種特性]

臺灣特有種，落葉中或小喬木，株高可達 20 公尺。葉子掌狀裂，先端漸尖，葉基心形，有鋸齒。秋冬季葉子轉紅後落葉，四季景觀鮮明。

[栽植要點]

喜冷涼至溫暖，生育適溫12-28℃，排水良好，日照充足。



苗栗紫金牛

[學名]

Ardisia miaoliensis

[樹種特性]

小灌木，耐陰性強，葉背紫色、
葉緣微呈波浪狀、果紅色，是極
佳的室內植栽。

[栽植要點]

林下耐陰性植物，適合種植於室
內環境。



野牡丹

[學名]

Melastoma candidum

[樹種特性]

常綠小灌木，全株具有絨毛，葉片及花朵大而明顯，花色桃紅喜氣。生長於低海拔林下或開闊的灌草叢中，是常見的野外植物。

[栽植要點]

喜歡全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



短柱山茶

[學名]

Camellia brevistyla

[樹種特性]

常綠灌木或小喬木，花為白色，生育溫度年平均約在20°C左右，適合較冷涼的氣候。種子含油率高，可用於榨油，做為「苦茶油」或「茶籽油」之用。

[栽植要點]

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



臺灣山茶

[學名]

Camellia formosensis

[樹種特性]

臺灣特有種，常綠小喬木，為臺灣原生野生茶樹，茶芽呈綠色或淡紫色，野外數量稀少，屬於接近受脅(NT)物種。

[栽植要點]

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



天仙果

[學名]

Ficus formosana

[樹種特性]

多年生的常綠小灌木，高約1-2公尺，葉形多變，有狹葉及寬葉形。果實成熟後則變為紫黑色，形似羊乳頭，又稱「羊奶頭」。根部具特殊香氣，常做藥膳燉煮藥材。

[栽植要點]

通風良好、潮濕冷涼且低日照量之環境。



臺灣肉桂(山肉桂)

[學名]

Cinnamomum
insularimontanum

[樹種特性]

常綠中喬木，樹皮平滑、微帶肉桂香味，可栽植於庭園、道路作綠化美化用，果實有獨特芳香味。

[栽植要點]

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



臺灣野牡丹藤

[學名]

Medinilla formosana

[樹種特性]

臺灣特有種，多年常綠蔓狀灌木植物，樹高0.5~2公尺，枝條長伸時呈蔓狀生長。花序下垂，成串聚集，照顧得宜可終年開花不斷。屬植物紅皮書中易危樹種。

[栽植要點]

半日照溫暖環境，烈日曝曬葉片容易黃化曬傷，耐陰性強，適合樹蔭下、建築物遮蔭處及中庭、室內等種植。



欒 (臺灣欒)

[學名]

Zelkova serrata

[樹種特性]

木材刨光後表面有油臘感，如同塗過雞油般，又稱「雞油」。葉子質地粗糙有如砂紙，初春萌芽嫩葉常呈鮮紅色；秋冬落葉前會變紅或變黃，具景觀價值。

[栽植要點]

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



桔梗蘭

[學名]
Dianella ensifolia

[樹種特性]
多年生草本，葉片像蘭花，但較為寬闊柔軟。花朵小巧，形似蘭花，花色及果實皆為藍紫色。

[栽植要點]
陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。