



# 2026年植樹月 贈苗活動

## 贈苗樹種介紹



林業及自然保育署  
臺中分署

Taichung Branch, Forestry and Nature  
Conservation Agency

# 土肉桂

*Cinnamomum osmophloeum*

臺灣特有種

根部及葉片肉桂醛含量高，可直接採葉嚼食或泡茶或浸酒飲用。枝葉提取的精油，具有芳香、殺菌與增甜等功效，可添加於防蚊驅蟲清潔用品、美容保養品與食品中。

耐陰性植物，為常綠喬木，亦為蝴蝶食草，適合種植於校園、住家或公園綠地。



# 臺灣百合

*Lilium formosanum*

臺灣特有種

多年生草本，花白色喇叭狀，基部及花被外中肋帶紫紋。花莖的角度變化特殊。在花苞初現時是0度、花苞成型時呈俯角180度、開花時再倒仰90度，結實時又回復0度；亦稱「垂直開花」。

種植時須注意勿傷鱗莖，平地4-5月開花，避免強光直射，冬天會休眠不需常澆水。



# 金毛杜鵑



*Rhododendron oldhamii*

臺灣特有種  
花色磚紅、艷麗，花期甚長，從 3 月一直可開到 10 月間，是臺灣野生杜鵑中花期最長的一種。

喜好陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



# 臺灣山桂花

*Maesa perlaria var.  
formosana*

常綠灌木，株高可達 3.5 公尺，花型形似桂花，故名山桂花。果實可做為鳥類食物、葉片為昆蟲食草。抗污染能力佳，適宜用作綠籬植物。

樹形強健、粗放，耐旱也耐濕、耐陰、抗瘠，喜歡生長在半遮蔭的步道旁，適於綠籬、水土保持或庭植美化。



# 山黃梔

*Gardenia jasminoides*

花朵曬乾後可供花茶香料，成熟果實可提取梔子黃色素，作為食品的天然黃色染料。

喜好陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



# 短柱山茶

## *Camellia brevistyla*

常綠灌木或小喬木，花為白色，生育溫度年平均約在20℃左右，適合較冷涼的氣候。種子含油率高，可用於榨油，做為「苦茶油」或「茶籽油」之用。

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



# 石斑木

*Rhaphiolepis indica var. tashiroi*

又名田代氏石斑木，常綠灌木，春季開花，適應性強，可栽植於濱海、工業區等環境較惡劣之地區，適宜做為綠帶植物。

全日照冷涼至高溫環境皆可種植，耐風、耐旱、耐貧瘠，排水良好的土壤為佳。



# 天仙果

*Ficus formosana*

多年生的常綠小灌木，高約1-2公尺，葉形多變，有狹葉及寬葉形。果實成熟後則變為紫黑色，形似羊乳頭，又稱「羊奶頭」。根部具特殊香氣，常做藥膳燉煮藥材。

適合通風良好、潮濕冷涼且低日照量之環境。



# 華八仙

*Hydrangea chinensis*

枝條柔軟易四散生長，春季在莖頂開花，多朵花聚集成球，外緣的不孕花像白蝴蝶，圍繞中間真正能受孕的淺黃色小花。

適合半日照且高濕度環境。不耐旱。春至秋季每季施用一次長效性肥料。如果枝條散亂，可以於冬季進行強剪。



# 霧社山櫻花

*Prunus taiwaniana*

臺灣特有種

花瓣白色，花期3~4月，花果是鳥獸的食物，鐘形花冠筒中富含蜜汁，核果紅熟時亦具甜味，為森林鳥獸之重要食餌。

適合中海拔全日照濕潤環境，因不易萌蘖，不建議大幅修剪枝條。



# 小葉赤楠

*Syzygium buxifolium*

常綠小喬木或灌木，小枝平滑，略四稜。分布於臺灣全島低中海拔林緣灌叢中。小葉赤楠的木材質地細緻，堅硬通直且韌性極佳，可做為做長槍及弓箭材料，也可以用來製作一般器具的把柄。

喜歡全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



# 月橘

*Murraya paniculata*

俗稱七里香

搓揉葉片會有類似柑橘的味道，持  
葉透過光線看會有許多「油點」，  
正是芸香科植物的明顯特徵。

喜好陽光充足處，適合砂質土，梅  
雨季節及夏日要慎防積水。



# 大葉溲疏

## *Deutzia pulchra*

落葉灌木或小喬木，全臺沿海到中海拔山區的林緣、坡地、河邊都能生長。枝條細軟，易四散生長，春夏季開花，花具香味。。

適合全日照溫暖至冷涼環境，不耐旱，夏季高溫時須注意保濕。



# 燈稱花

*Ilex asprella*

落葉性大灌木，高 1~2 公尺(老株可達 3 公尺以上)，細莖枝多，枝條上密佈皮孔似秤點(或說秤花)，故名燈稱花。花朵小而枝葉較疏，常用於庭園造景。

耐半蔭，可栽植於室內、窗邊或是室外遮蔭陽台，不宜栽植於陽光過強的地方。



# 臺灣肉桂

*Cinnamomum  
insularimontanum*

臺灣特有種

俗稱山肉桂

常綠中喬木，樹皮平滑、微帶肉桂香味，可栽植於庭園、道路作綠化美化用，果實有獨特芳香味。

適合全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。



# 日本山茶

*Camellia japonica*

花期 1~4 月，臺灣原生茶屬植物中花最大且最為紅艷的茶花，生命力強健。

適合透氣濕潤、有機質豐富、排水良好的微酸性土壤。適合半遮陰的環境。不適合烈日暴晒，陽光直射易灼傷葉片。



# 樟葉槭

*Acer albopurpurascens*

臺灣特有種

臺灣原生槭樹屬(Acer)中唯一的常綠植物，綠葉面油亮暗綠色，背面粉白色，葉子冬季不會轉紅。為姬三尾小灰蝶、田中烏小灰蝶、埔里琉璃小灰蝶等蝶類食草。

陽性樹種，喜半日照以上。深根性，壤土至乾旱岩壁皆能生長，最喜砂質壤土。



# 黃荊

*Vitex negundo*

半落葉性灌木或小喬木，夏季大量同時開花，花量大且為良好蜜源植物，葉片具特殊香味，可做藥用或香草植物。

喜高溫、陽光充足及排水良好的砂質或壤土環境，具耐風、耐旱、耐貧瘠特性。



# 楓香

*Liquidambar formosana*

葉子夏綠秋紅，形似三叉戟，果實如圓形小刺球，外型充滿趣味且木料用途廣泛，廣受大眾喜愛。

喜好陽光充足處，適合砂質土，梅雨季節及夏日要慎防積水。



# 野牡丹

## *Melastoma candidum*

常綠小灌木，全株具有絨毛，葉片及花朵大而明顯，花色桃紅喜氣。生長於低海拔林下或開闊的灌草叢中，是常見的野外植物。

喜歡全日照或半日照，排水良好的砂質壤土為佳。

